


**MARCA**

**Vyondys 53**



## **PRINCIPIO ACTIVO**

Golodirsén 100 mg/2 ml

## **INDICACIÓN**

Distrofia Muscular de Duchenne

## **FABRICANTE**

Sarepta Pharmaceuticals

## **ORIGEN**

Estados Unidos



**MARCA**

# Koselugo 25 mg

**PRINCIPIO ACTIVO**

Selumetinib 25 mg

**INDICACIÓN**

Neurofibromatosis (un trastorno genético que hace que se desarrollen tumores en los nervios) en niños.

**FABRICANTE**

AstraZeneca

**ORIGEN**

Suiza



**MARCA**

Caprelsa 100 mg / 300 mg



**PRINCIPIO ACTIVO**

Vandetanib 100 mg // 300 mg

**INDICACIÓN**

Tratamiento para el cáncer medular de tiroides avanzado.

**FABRICANTE**

Sanofi

**ORIGEN**

Francia



**MARCA**

**Cinryze 500U**



## **PRINCIPIO ACTIVO**

Inhibidor de la C1 esterasa humano 500U

## **INDICACIÓN**

Tratamiento y prevención preoperatoria de las crisis de angioedema en adultos, adolescentes y niños con angioedema hereditario (AEH).

## **FABRICANTE**

Shire

## **ORIGEN**

Belgica



**MARCA**

**Penepin 0.3 ML**



## **PRINCIPIO ACTIVO**

Epinefrina 0,15/0,3 ML // 0,3/0,3 ML

## **INDICACIÓN**

Tratamiento de reacciones alérgicas muy graves a picaduras/picaduras de insectos, alimentos, medicamentos u otras sustancias.

## **FABRICANTE**

Vem

## **ORIGEN**

Turquía



## MARCA

Alecensa 150 mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Alectinib 150 mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de un tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) que se ha propagado a otras partes del cuerpo.

## FABRICANTE

Roche

## ORIGEN

Alemania



## MARCA

Arsenico Trioxido 1mg/ml



## PRINCIPIO ACTIVO

Arsitri 1mg/1ml

## INDICACIÓN

Se usa en combinación con tretinoína para tratar la leucemia promielocítica aguda (apl; un tipo de cáncer en el que hay demasiadas células sanguíneas inmaduras en la sangre y la médula ósea) en ciertas personas como primer tratamiento.

## FABRICANTE

NEON

## ORIGEN

India



## MARCA

Leucoginase 10000 UI



## PRINCIPIO ACTIVO

Asparaginasa 10000 UI

## INDICACIÓN

Tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda.

## FABRICANTE

VHB

## ORIGEN

India



## MARCA

Erwinia 10000 UI



## PRINCIPIO ACTIVO

Asparaginasa Erwiniana 10000 UI

## INDICACIÓN

Tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda.

## FABRICANTE

GUANGZHOU BAIYUNSHAN

## ORIGEN

China



## MARCA

Stensiq 40 mg // 80 mg // 100 mg

**STRENSIQ**



## PRINCIPIO ACTIVO

Asfotasa Alfa 40 mg // 80 mg // 100 mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de personas con hipofosfatasia perinatal/infantil y juvenil.

## FABRICANTE

ALEXION

## ORIGEN

Irlanda



## MARCA

Acido Quenodeoxicólico Leadiant 250mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Acido Quenodeoxicólico 250mg

## INDICACIÓN

Tratamiento para disolver los cálculos biliares de colesterol.

## FABRICANTE

LEADIANT


## ORIGEN

Alemania



## MARCA

Translarna 125mg // 250mg // 1000mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Ataluren 125mg // 250mg // 1000mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne (DMD)

## FABRICANTE

PTC Therapeutics

## ORIGEN

Reino Unido



## MARCA

Bavencio 20 mg/10 ml



## PRINCIPIO ACTIVO

Avelumab 20 mg/10 ml

## INDICACIÓN

Tratamiento de un tipo específico de cáncer de piel, el carcinoma de células de Merkel metastásico (mcc).

## FABRICANTE

Merck

## ORIGEN

Países Bajos



**MARCA**

Radicut 30 MG/20 ML



**PRINCIPIO ACTIVO**

EDARAVONE 30 MG/20 ML

**INDICACIÓN**

Tratamiento del trastorno de las actividades de la vida diaria y trastorno funcional asociado con accidente cerebrovascular isquémico; Inhibición de la progresión del trastorno funcional en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

**FABRICANTE**

MITSUBISHI

**ORIGEN**

Japon



**MARCA**  
Trikafta



## PRINCIPIO ACTIVO

ELEXACAFTOR /TEZACAFTOR/IVACAFTOR  
(100/50/75 mg) e IVACAFTOR (150 mg)

## INDICACIÓN

Tratamiento de la fibrosis quística (FQ) en pacientes de 6 años o más que presentan al menos una copia de la mutación F508del en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR) u otra mutación que responda al tratamiento con TRIKAFTA.

## FABRICANTE

VERTEX

## ORIGEN

Estados Unidos



**MARCA**  
Kalydeco 150 MG



**PRINCIPIO ACTIVO**  
IVACAFACTOR 150 MG

**INDICACIÓN**  
Tratamiento de la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que afecta gravemente a los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos.

**FABRICANTE**  
VERTEX

**ORIGEN**  
Estados Unidos



## MARCA

Orkambi 125 + 200 MG



## PRINCIPIO ACTIVO

IVACAFTOR+LUMACAFTOR 125 + 200 MG

## INDICACIÓN

Tratamiento de pacientes con fibrosis quística (FQ) de 6 años de edad o mayores homocigóticos para la mutación F508del en el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR).

## FABRICANTE

VERTEX

## ORIGEN

Estados Unidos



## MARCA

Taloxa 600 MG



## PRINCIPIO ACTIVO

Felbamato 600 MG

## INDICACIÓN

Tratamiento para controlar las crisis epilépticas parciales (convulsiones) en el tratamiento de la epilepsia.

## FABRICANTE

MSD

## ORIGEN

Suiza



## MARCA

Tambocor 50MG



## PRINCIPIO ACTIVO

Flecainide 50 MG

## INDICACIÓN

Tratamiento que bloquea ciertas señales eléctricas en el corazón que pueden causar latidos cardíacos irregulares.

## FABRICANTE

Meda

## ORIGEN

Estados Unidos



**MARCA**  
Vosevi



## **PRINCIPIO ACTIVO**

Sofosbuvir 400 mg/velpatasvir 100 mg/voxilaprevir 100mg

## **INDICACIÓN**

Tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC) en adultos

## **FABRICANTE**

Gilead

## **ORIGEN**

Irlanda



**MARCA**  
Ravicti



## **PRINCIPIO ACTIVO**

GLICEROL FENILBUTIRATO 1,1 GR / ML

## **INDICACIÓN**

Tratamiento de ciertos trastornos congénitos del ciclo de la urea. El medicamento funciona al prevenir la acumulación dañina de amoníaco en el cuerpo.

## **FABRICANTE**

Immedica Pharma AB

## **ORIGEN**

Suecia



**MARCA**  
Ruconest



## PRINCIPIO ACTIVO

INHIBIDOR DE LA C1 ESTERASA RECOMBINANTE /  
CONESTAT ALFA 2100 U

## INDICACIÓN

Tratamiento del angioedema hereditario (Hae). Hae es una enfermedad rara que causa hinchazón de la cara, las manos, los pies, la garganta, el estómago, los intestinos o los genitales.

## FABRICANTE

Pharming Group N.V.

## ORIGEN

Paises Bajos



## MARCA

Lenvima 4mg / 10mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Lenvatinib 4mg / 10mg

## INDICACIÓN

Tratamiento el cáncer de tiroides, cáncer de riñón, cáncer de hígado y cáncer de endometrio avanzado.

## FABRICANTE

Eisai GmbH.

## ORIGEN

Alemania



## MARCA

Lorviqua 100mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Lorlatinib 100mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de adultos en fases avanzadas de un tipo de cáncer de pulmón llamado cáncer de pulmón no microcítico (CPNM). Lorviqua pertenece al grupo de medicamentos que inhiben una enzima llamada quinasa del linfoma anaplásico (ALK).

## FABRICANTE

Pfizer

## ORIGEN

Belgica



## MARCA

Lysodren 500mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Mitotano 500mg

## INDICACIÓN

Tratamiento del cáncer de la glándula suprarrenal (carcinoma cortical suprarrenal).

## FABRICANTE

HRA Pharma

## ORIGEN

Francia



## MARCA

Somavert 10mg / 20 mg



## PRINCIPIO ACTIVO

PEGVISOMANT 10mg / 20mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de la acromegalia, un trastorno hormonal resultante del aumento de la secreción de la hormona de crecimiento (HC) y del IGF-I (factores de crecimiento tipo insulina), y se caracteriza por sobrecrecimiento de los huesos, engrosamiento de los tejidos blandos, enfermedad del corazón y trastornos relacionados.

## FABRICANTE

Pfizer

## ORIGEN

Belgica



## MARCA

Petinimid 250 mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Etosuximida 250 mg

## INDICACIÓN

Tratamiento para el Control de las crisis de ausencia (petit mal). En tto. combinado con otros antiepilépticos cuando las crisis de ausencia coexisten con crisis generalizadas tónico-clónicas (grand-mal) o con otras formas de epilepsia.

## FABRICANTE

Gerot Lannach Pharma

## ORIGEN

Austria



## MARCA

Samsca 15 mg / 30 mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Tolvaptan 15 mg / 30 mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de hiponatremia secundaria al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIHAD).

## FABRICANTE

Otsuka Pharmaceutical

## ORIGEN

Países Bajos



## MARCA

Vesanoid 10mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Tretinoína 10 mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de un tipo de problema sanguíneo llamado “leucemia promielocítica aguda”. Este medicamento actúa reduciendo el crecimiento de cierto tipo de células sanguíneas enfermas

## FABRICANTE

CHEPLAPHARM

## ORIGEN

Alemania



**MARCA**  
SYPRINE 250mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Trientina 250 mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de la enfermedad de Wilson, una enfermedad en la que hay demasiado cobre en el cuerpo. Este medicamento se combina con el exceso de cobre en el cuerpo y puede evitar que su cuerpo absorba el cobre en los alimentos que come. Eliminar el cobre del cuerpo previene daños al hígado, el cerebro y otros órganos.

## FABRICANTE

Valeant

## ORIGEN

Estados Unidos



## MARCA

Tafamidis 61 mg



## PRINCIPIO ACTIVO

Vyndaqel 61 mg

## INDICACIÓN

Tratamiento de la miocardiopatía y la neuropatía periférica debidas a la amiloidosis por transtiretina (Attr).

## FABRICANTE

Pfizer

## ORIGEN

Alemania



## MARCA

Kanuma 20 mg/10 ml



## PRINCIPIO ACTIVO

Sebelipasa alfa 20 mg/10 ml

## INDICACIÓN

Tratamiento la deficiencia de lipasa ácida lisosomal.

## FABRICANTE

Alexion

## ORIGEN

Irlanda



**MARCA**  
Artane 5MG



**PRINCIPIO ACTIVO**  
TRIHEXIFENIDILO 5MG

**INDICACIÓN**

Tratamiento de los síntomas de la enfermedad de Parkinson (rigidez, temblores, espasmos, control muscular deficiente).

**FABRICANTE**

Teofarma

**ORIGEN**

España



**MARCA**  
Stivarga 40MG



**PRINCIPIO ACTIVO**  
Regorafenib 40MG

**INDICACIÓN**

Tratamiento del cancer de colon y recto. También se usa para tratar el cáncer de hígado y cierto cáncer del sistema digestivo.

**FABRICANTE**

Bayer

**ORIGEN**

Alemania



**MARCA**  
**HAEMOCOMPLETTAN 1 GR**



**PRINCIPIO ACTIVO**  
**FIBRINOGENO HUMANO 1 GR**

**INDICACIÓN**  
Es un agente hematológico. Funciona reemplazando cierta proteína en la sangre que ayuda con la coagulación de la sangre.

**FABRICANTE**  
CSL Behring

**ORIGEN**  
Alemania

